

<b>腎細胞がん Temsirolimus</b>					1コースの期間
テムシロリムス (トーリセル)	25	mg/body	点静	Day1	7

<b>腎細胞がん Nivo(2週毎)</b>					1コースの期間
ニボルマブ (オプジーボ)	240	mg/body	点静	Day1	14

<b>腎細胞がん Nivo(4週毎)</b>					1コースの期間
ニボルマブ (オプジーボ)	480	mg/body	点静	Day1	28

<b>腎細胞がん Pem(3週毎)</b>					1コースの期間
ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	200	mg/body	点静	Day1	21

<b>腎細胞がん Pem(6週毎)</b>					1コースの期間
ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	400	mg/body	点静	Day1	42

<b>腎細胞がん Avelumab</b>					1コースの期間
アベルマブ (バベンチオ)	10	mg/kg	点静	Day1	14

<b>腎細胞がん Nivo(2週毎)+Cabozantinib</b>					1コースの期間
ニボルマブ (オプジーボ)	240	mg/body	点静	Day1	14
カボザンチニブ (カボメティクス)	40	mg/日	内服	連日	

※カボザンチニブは空腹時服用 (食事の1時間前から食後2時間までの間は服用を避ける)

<b>腎細胞がん Nivo(4週毎)+Cabozantinib</b>					1コースの期間
ニボルマブ (オプジーボ)	480	mg/body	点静	Day1	28
カボザンチニブ (カボメティクス)	40	mg/日	内服	連日	

※カボザンチニブは空腹時服用 (食事の1時間前から食後2時間までの間は服用を避ける)

<b>腎細胞がん Pem(3週毎)+Axitinib</b>					1コースの期間
ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	200	mg/body	点静	Day1	21
アキシチニブ (インライタ)	10	mg/日	内服	連日	

※アキシチニブは認容性が認められた場合、最大20mg/日まで増量可 (10mg/日 14日間→15mg/日 14日間→20mg/日)

<b>腎細胞がん Pem(6週毎)+Axitinib</b>					1コースの期間
ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	400	mg/body	点静	Day1	42
アキシチニブ (インライタ)	10	mg/日	内服	連日	

※アキシチニブは認容性が認められた場合、最大20mg/日まで増量可 (10mg/日 14日間→15mg/日 14日間→20mg/日)

<b>腎細胞がん Pem(3週毎)+Lenvatinib</b>					1コースの期間
ペムブロリズマブ (キイトルーダ)	200	mg/body	点静	Day1	21
レンバチニブ (レンビマ)	20	mg/日	内服	連日	

腎細胞がん Pem(6週毎)+Lenvatinib					1コースの期間
ペムプロリズマブ (キイトルーダ)	400	mg/body	点静	Day1	42
レンバチニブ (レンビマ)	20	mg/日	内服	連日	

腎細胞がん Avelumab+Axitinib					1コースの期間
アベルマブ (バベンチオ)	10	mg/kg	点静	Day1	14
アキシチニブ (インライタ)	10	mg/日	内服	連日	

※アキシチニブは認容性が認められた場合、最大20mg/日まで増量可 (10mg/日 14日間→15mg/日 14日間→20mg/日)

腎細胞がん Ipi+Nivo					1コースの期間
イピリムマブ (ヤーボイ)	1	mg/kg	点静	Day1	21
ニボルマブ (オプジーボ)	240	mg/body	点静	Day1	
Ipi+Nivo 4コース終了後はニボルマブ維持療法 (2週毎or4週毎) へ移行					
ニボルマブ (オプジーボ)	240	mg/body	点静	Day1	14
ニボルマブ (オプジーボ)	480	mg/body	点静	Day1	28