

膀胱がん GEM					1コースの期間
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点静	Day1, 8, 15	28

膀胱がん GEM+S-1					1コースの期間
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点静	Day1, 8	21
エスワン (S-1)	60	mg/m ² /日	内服	Day1-14	

膀胱がん GEM+nab-PTX					1コースの期間
ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点静	Day1, 8, 15	28
アルブミン懸濁型パクリタキセル (アブラキサン)	125	mg/m ²	点静	Day1, 8, 15	

膀胱がん mFOLFIRINOX					1コースの期間
オキサリプラチン	85	mg/m ²	点静	Day1	14
レボホリナート	200	mg/m ²	点静	Day1	
イリノテカン	150	mg/m ²	点静	Day1	
フルオロウラシル (5FU)	2400	mg/m ²	点静	Day1-2 (46hr)	

膀胱がん FOLFIRINOX					1コースの期間
オキサリプラチン	85	mg/m ²	点静	Day1	14
レボホリナート	200	mg/m ²	点静	Day1	
イリノテカン	180	mg/m ²	点静	Day1	
フルオロウラシル (5FU)	400	mg/m ²	点静	Day1	
フルオロウラシル (5FU)	2400	mg/m ²	点静	Day1-2 (46hr)	

膀胱がん nal-IRI+5FU+l-LV					1コースの期間
リポソーム型イリノテカン (オニバイト)	70	mg/m ²	点静	Day1	14
レボホリナート	200	mg/m ²	点静	Day1	
フルオロウラシル (5FU)	2400	mg/m ²	点静	Day1-2 (46hr)	